

Y tú, vacunas bien del tétanos?



ASANEC
Asociación Andaluza
de Enfermería Familiar y Comunitaria

VACUNA TÉTANOS Y HERIDAS

ESTADO VACUNAL	HERIDA LIMPIA	HERIDA TETANIGENA	
	Vacuna Td	Vacuna Td	Inmunoglobulina antitetánica
No vacunado, menos de 3 dosis o desconocido	1 DOSIS y completar pauta de vacunación	1 DOSIS y completar pauta de vacunación	1 DOSIS en lugar anatómico diferente de la vacuna
3 ó 4 dosis	1 DOSIS si hace más de 10 años desde última dosis	1 DOSIS si hace más de 5 años desde última dosis	Solo en heridas de ALTO RIESGO
5 ó más dosis	NO NECESARIA	NO NECESARIA (si hace más de 10 años valorar una única dosis adicional en función del tipo de herida)	Solo en heridas de ALTO RIESGO
En inmunodeprimidos, VIH y usuarios de drogas parenterales se administrará una dosis de inmunoglobulina antitetánica independientemente del estado de vacunación			

HERIDAS

TETANÍGENA	Herida o quemadura con importante grado de tejido desvitalizado, herida punzante en contacto con suelo o estiércol, las contaminadas con cuerpo extraño, fracturas con herida, mordeduras, congelación, las que requieran intervención quirúrgica y que ésta se retrase más de 6 horas, las heridas en pacientes con sepsis sistémicas
ALTO RIESGO	Herida tetanígena contaminada con gran cantidad de material que pueda contener esporas o presenta grandes zonas de tejido desvitalizado.

PAUTA VACUNACIÓN dT ADULTOS

PRIMOVACUNACION: 3 dosis			RECUERDO: 2 dosis		Embarazo	65 años
0 meses	2 meses	6 meses	10 años	10 años		
dT	dT	dT	dT ó dTpa	dT ó dTpa	dTpa	dT

SEMANA MUNDIAL DE LA INMUNIZACIÓN