

CALENDARIO SISTEMÁTICO de ANDALUCÍA de TODA LA VIDA 2024 **VACUNAS FINANCIADAS**

<https://www.andavac.es/ calendario-vacunaciones/>

VACUNAS	PRE NATAL	0 MESES	2 MESES	3 MESES	4 MESES	6 MESES	11 MESES	12 MESES	15 MESES	3 AÑOS	4 AÑOS	6 AÑOS	12 AÑOS	13 AÑOS	14 AÑOS	15 AÑOS	18 AÑOS	50 AÑOS	60 AÑOS	65 AÑOS	73 AÑOS	+73 AÑOS	
TETANOS DIFTERIA TOSFERINA	Tdpa ¹		DTPa		DTPa		DTPa					DTPa ²			Td		Td ³			Td		Td ³	
POLIOMIELITIS			VPI		VPI		VPI					VPI ²											
HEPATITIS B		HB ⁴	HB		HB		HB		HB ⁵														
HAEMOPHILUS Influenzae tipo B			Hib		Hib		Hib																
NEUMOCOCO ⁶ CONJUGADA			VNC13		VNC13		VNC13															VNC20	
TRIPLE VIRICA								TV		TV			TV ⁷										
VARICELA									VVZ	VVZ			VVZ ⁸										
GRUPE	Gripe ⁹					Gripe Infantil ¹⁰																Gripe Anual ¹¹	
PAPILOMAVIRUS													VPH ¹²	VPH ¹³									
MENINGOCOCO B ¹⁴			MenB		MenB				MenB														
MENINGOCOCO ACWY					Men ¹⁵ ACWY			Men ¹⁶ ACWY					Men ¹⁷ ACWY	Men ¹⁸ ACWY									
HERPES ZOSTER																						HZ ¹⁹	

VACUNAS NO FINANCIADAS ACTUALMENTE, PERO RECOMENDADAS POR SOCIEDADES CIENTIFICAS


VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL	VRS ²⁰																					VRS ²¹
MENINGOCOCO ACWY			Men ²² ACWY									Men ²³ ACWY										
MENINGOCOCO B													MenB ²⁴									
ROTA VIRUS			RV	RV	(RV) ²⁵																	
HERPES ZOSTER																						HZ ²⁶
GRUPE													Gripe ²⁷									

SIGLAS DTPa: Vacuna frente a tétanos, difteria y tosferina acelular de alta carga o infantil. Tdpa: Vacuna frente a tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga o tipo adulto. Td: Vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto. HB: Vacuna frente a hepatitis B. VPI: Vacuna frente al virus de la poliomielitis inactivada. Hib: Vacuna frente a Haemophilus influenzae tipo b. VNC13: Vacuna Neumocócica Conjugada 13 valente. VNC20: Vacuna Neumocócica Conjugada 20 valente. TV: Vacuna triple vírica frente a sarampión, rubeola, parotiditis. VVZ: Vacuna frente a virus varicela zóster. MenACWY: Vacunas conjugadas frente a meningococo de los serogrupos A,C,W e Y. MenB: Vacunas frente a meningococo del serogrupo B. VPH: Vacuna frente a virus del papiloma humano. RV: Vacunas frente al rotavirus. HZ: Vacuna frente a Herpes Zoster. VRS: Vacuna frente al virus respiratorio sincital.



1. Vacuna frente a tosferina prenatal (Boostrix®): una dosis de Tdpa (Boostrix®) en cada embarazo a partir de la semana 27 de gestación, pero preferentemente en las semanas 27 o 28. **2.** Vacuna DTPa-VPI a los 6 años (Tetraxim®): se administrará una dosis de Tetraxim® a los nacidos a partir del 1 de enero de 2017, que recibieron un esquema 2+1 (2, 4 y 11 meses). Los nacidos antes de 2017 (recibieron un esquema 3+1: 2, 4, 6 y 18 meses) que no hayan recibido aún la dosis de Tdpa de los 6 años, recibirán una dosis de vacuna Tdpa sin polio (Boostrix®). **3.** Vacuna Td en personas adultas (Diftavax®): verificar el estado de vacunación previo antes de iniciar o completar una pauta de primovacunación con Td en personas adultas. El contacto con los servicios sanitarios, incluyendo los de prevención de riesgos laborales, se utilizará para revisar el estado de vacunación y, en caso necesario, se vacunará con Td hasta completar 5 dosis. Se administrará una dosis de Td en torno a los 65 años a las personas que recibieron 5 dosis durante la infancia y la adolescencia. **4.** Vacuna monocomponente frente a hepatitis B en el recién nacido: en recién nacidos de madre con hepatitis B (AgHBs+) se administrará la primera dosis en las primeras 24 horas de vida (preferentemente primeras 12 horas), junto con la administración de inmunoglobulina anti-HB. En caso de madre con AgHBs desconocido, si no podemos disponer de los resultados en las primeras 24 horas de vida, el neonato también recibirá una dosis de vacuna de hepatitis B. En todos ellos siempre se continuará con el esquema estándar de vacuna hexavalente: 2, 4 y 11 meses. En estos menores, por tanto, se realiza una pauta con 4 dosis de hepatitis B: a los 0, 2, 4 y 11 meses de edad. **5.** Vacuna monocomponente frente a hepatitis B en adolescentes y jóvenes: en personas no vacunadas con anterioridad, hasta los 18 años de edad, se administrarán 3 dosis, con pauta 0, 1 y 6 meses. **6.** Vacuna frente a neumococo conjugada: administración de la vacuna neumocócica conjugada 13-valente (VNC13: Prevenar 13®) a los 2, 4 y 11 meses. Administración de la vacuna neumocócica conjugada 20-valente (VNC20: Apexxnar®) a todas las personas nacidas entre el 1 enero 1951 y el 31 diciembre 1964 que no hayan recibido ni VNC13 ni VNC20 previamente. **7.** Vacuna de rescate con triple vírica (TV) (M-R-V-VaxPro®): se aprovechará el contacto con los servicios sanitarios, incluyendo los de prevención de riesgos laborales, para revisar el estado de vacunación. Se recomienda la vacunación en personas de hasta 65 años sin historia de vacunación ni constancia de antecedente de padecimiento del sarampión. En caso necesario, se administrarán 2 dosis de TV con un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis. En caso de haber recibido una dosis con anterioridad se administrará una dosis de TV. Esta vacunación está contraindicada en embarazadas y en personas inmunodeprimidas. **8.** Vacuna de rescate frente a varicela (VVZ) (Varivax®): vacunación de rescate en personas de hasta 65 años de edad que no refieran antecedentes de haber pasado la varicela ni se hayan vacunado, se administrarán 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas (preferiblemente 8 semanas). Si tienen una dosis previa, se administrará una dosis. En adultos, se realizará serología de varicela (IgG) si no presenta antecedentes de enfermedad ni de vacunación. Esta vacunación está contraindicada en embarazadas y en personas inmunodeprimidas. **9.** Vacuna antigripal durante el embarazo: en cada campaña de gripe se vacunará a todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación o durante los primeros 6 meses del puerperio. **10.** Vacuna antigripal anual de 6 a 59 meses: en cada campaña anual de gripe se vacunará a todos los niños y niñas que tengan esta edad durante la campaña con una dosis de cualquiera de las vacunas disponibles autorizadas para su edad. **11.** Vacuna antigripal anual en personas de 60 años o más: en cada campaña anual de gripe, se recomienda la vacunación de todas las personas de 60 años o más. **12.** Vacuna frente a virus del papilomavirus humano (VPH) en chicos y chicas de 12 años (nacidos en 2012) (Gardasil 9®): se administrará una dosis de Gardasil 9®. **13.** Vacuna de rescate frente a papilomavirus humano (VPH) (Gardasil 9®): se administrará una dosis de Gardasil 9® a las chicas de 13 a 18 años (nacidas entre 2005 y 2011) y a los chicos de 13 años (nacidos en 2011) que no hubieran recibido aún ninguna dosis de cualquier vacuna frente a VPH (Cervarix®, Gardasil® o Gardasil 9®). **14.** Vacuna frente a meningococo B (Bexsero®): sólo para nacidos a partir del 1 de octubre de 2021. **15.** Vacuna frente a meningococo ACWY a los 4 meses (Nimenrix®): se administrará una dosis de Nimenrix® sólo a los nacidos a partir del 1 de octubre de 2023. También se les administrará a los lactantes nacidos antes de esta fecha y que no hayan recibido aún ni la vacuna del meningococo C ni la del meningococo ACWY. **16.** Vacuna frente a meningococo ACWY a los 12 meses (MenQuadfi®): se administrará una dosis de MenQuadfi®. **17.** Vacuna frente a meningococo ACWY a los 12 años (MenQuadfi®): se administrará una dosis de a los adolescentes que no hayan recibido una dosis de meningococo ACWY después de los 10 años de edad. **18.** Vacuna de rescate frente a meningococo ACWY de 13 a 18 años (MenQuadfi®): se administrará una dosis de MenQuadfi® a aquellos de 13 a 18 años que no hayan recibido previamente ninguna dosis de cualquier vacuna frente a meningococo ACWY (Nimenrix®, MenQuadfi® o Menveo®). **19.** Vacuna frente a herpes zóster (Shingrix®): se administrará una pauta de 2 dosis, separadas por al menos 2 meses a las personas de 65 años (nacidos en 1959). Se implantará durante 2024. Se informará del momento de inicio de esta vacunación sistemática en una actualización próxima de esta instrucción.

20. Vacuna frente a Virus Respiratorio Sincitial prenatal (Abrysvo®): una dosis en cada embarazo entre las semanas 24 y 36 de gestación. **21.** Vacuna frente a Virus Respiratorio Sincitial (Abrysvo®) a los 60 años y mayores. **22.** Proteger al niño de forma temprana a los 2 meses frente a MenACWY según ficha técnica completando la protección con las dosis financiadas de los 4 y 12 meses. NIMENRIX es la única vacuna frente a MenACWY autorizada en el primer año de vida. **23.** Vacunación de rescate frente a MenACWY de los niños no vacunados desde los 6 a los 12 años (nacidos antes de la entrada en vigor de la vacunación financiada a los 12 meses, en enero de 2020). **24.** Vacunación de rescate frente a MenB a resto de edades pediátricas y la adolescencia, (BEXSERO o TRUMENBA a partir de los 10 años de edad, pauta 0- 6 meses). **25.** La pauta de ROTAVIRUS difiere según la marca (con coste similar) Rotarix (2- 3), Rotateq (2- 3- 4). **26.** Vacuna frente a Herpes Zóster (Shingrix®) a partir de los 50 años. **27.** Conseguir una protección universal frente a Gripe con la vacunación en niños desde los 5 años y en adultos hasta los 59 años.



asanec

Asociación Andaluza de
Enfermería Comunitaria

