

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GRIPE Y COVID ~ANDALUCÍA 2023-2024~

Motivos para vacunarse

- La gripe se asocia a **alta tasa de morbilidad y mortalidad**
- Temporada puede ser **más agresiva por un menor contacto con el virus** en los últimos 2 años
- La **inmunidad frente al COVID-19 disminuye** con el tiempo y la **mayoría de personas** recibieron la **última dosis** de COVID-19 **hace más de 9 meses**.
- **Coinfección de gripe y COVID-19 presenta mayor riesgo de muerte**
- Se debe **evitar la enfermedad en personas con mayor riesgo** de desarrollar complicaciones y **que pueden transmitir la enfermedad** a los más vulnerables
- Población diana con indicación para vacuna antigripal es prácticamente la misma que para COVID-19.




- Residencias y centros de discapacidad
- Mayores 85 años
- Personal de centros sanitarios y sociosanitarios
- Niños 6-59 meses que acudan a otras vacunas



- Mayores de 70 años
- Niños de entre 6-59 meses
- Niños y adultos con patologías de riesgo
- Grandes dependientes y sus cuidadores profesionales
- Embarazadas



- Mayores de 60 años
- Cuerpos y fuerzas de seguridad e instituciones penitenciarias
- Veterinarios y ganaderos



A partir de diciembre 2023



Convivientes con mayores de 60 años o con personas en riesgo



Coadministración con otras vacunas

NEUMOCOCO


- Vacunación sistemática personas de entre 60-72 años.
- Vacunación por pertenecer a grupos de riesgo alto o moderado de Enfermedad Neumocócica Invasora.

- Se tendrán en cuenta la edad, el riesgo y el antecedente vacunal frente a neumococo.

IMPORTANTE:
Se recomienda la **coadministración de neumococo, en el mismo acto vacunal que gripe y COVID-19.**

OTRAS VACUNAS

- Si existe indicación de otra vacuna (Nirsevimab, Td, Tdpa, herpes zóster u otra vacuna del calendario sistemático) **pueden coadministrarse las tres vacunas en el mismo acto vacunal.**
- Cuando se administren dos vacunas en la misma extremidad, se dejarán al menos 2,5 cm.
- Si se administra COVID-19 se recomienda en extremidad no dominante y como única vacuna en esa extremidad.



Consideraciones especiales



- Enfermedad febril o proceso agudo moderado o grave: se desaconseja la inmunización. **NO es necesario retrasar en procesos leves.**
- **Alergia al huevo:** sujetos con **reacciones leves** pueden recibir **cualquier vacuna** mientras que sujetos con **reacciones graves** recibirán específicamente **Flucelvax Tetra.**
- Otras situaciones: trastornos coagulación y tratamientos anticoagulantes se recomienda utilizar aguja 23G y presión durante 2 minutos en la zona de punción.



RECUERDA
Cada **contacto asistencial** es una **oportunidad** para **revisar y completar el estado vacunal**

