

IV JORNADA DE VACUNAS asanec

Sevilla 20 - 21 SEP 2024



VACUNAS CUANDO PLANEAMOS UN VIAJE

María del Mar Iozano Martínez Enfermera Sanidad Exterior Almería
Antonia Becerra Fernández Enfermera UGC Lucano Córdoba



Traducir 🌐

Está usted en:

[🏠](#) > [Áreas](#) > [Sanidad Exterior](#) > [La salud también viaja: Centros de Vacunación Internacional](#) > [Centros de Vacunación Internacional](#) > [Relación de Centros de Vacunación Internacional](#)

Quiénes somos
La salud también viaja: Centros de Vacunación Internacional
Controles higiénico-sanitarios en los puntos de entrada
Importación
Exportación
Material biológico
EuroCigua II

Relación de Centros de Vacunación Internacional

En este apartado se relacionan todos los **Centros de Vacunación Internacional** con sus direcciones de localización, teléfonos de cita previa y consulta médica, correos electrónicos institucionales de consulta para el ciudadano, y horarios de atención al público. Puede consultar el listado de Centros o clicar sobre la provincia a la que desea acudir, en el mapa interactivo.

Así mismo, es aconsejable la concertación de "**Cita Previa**" por vía telemática en el siguiente enlace [🔗](#)



> A CORUÑA

- Sanidad Exterior

C/ Durán Loriga, 3 - 5ª Planta








RIESGOS PARA LA SALUD



- País de destino
- Características del viaje: turismo, mochilero
- Tipo de alojamiento
- Duración del viaje: ≥ 3 semanas



Figura 1: Países, territorios y áreas que notifican casos autóctonos de dengue (de noviembre de 2022 a noviembre de 2023)*





RIESGOS PARA LA SALUD

Viajero:

- Edad.
- Embarazo.
- Patología asociada
- Vacunaciones previas
- Nivel sociocultural
- Percepción del riesgo



VFR: Recomendaciones y requisitos de vacunación son lo mismo que para el resto de viajeros:

- En ausencia de documentación de vacunas, considere a los viajeros adultos susceptibles y ofrézcales vacunas apropiadas para su edad.



RIESGOS PARA LA SALUD


**ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR AGUA Y ALIMENTOS:**
Hepatitis A, Fiebre tifoidea, Polio,
Cólera, diarrea del viajero

**ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR VECTORES:**
Fiebre amarilla, Malaria Dengue,
Zika, Chikungunya.....

OTROS RIESGOS: Meningitis
ACWY, ITS, Rabia, mal de altura,
Jet Lag....



ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS : VACUNAS



asanec
Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria



[News \(who.int\)](https://www.who.int)



ASUNTO: INSTRUCCIÓN INFORMATIVA N.º 6/MED/2024. ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PREVIAS RELATIVAS A LA DISEMINACIÓN DE POLIOVIRUS SALVAJE Y VACUNAL EN EL MUNDO COMO EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII).

Madrid, 20 de agosto de 2024






MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS



LA SALUD TAMBIÉN VIAJA





Durante el viaje

Alimentos y bebidas. DECÁLOGO

“Los alimentos cocinados, pelados o no tomados”


1. Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes y después de comer, manipular alimentos, ir al baño, etc.
2. Beba agua embotellada o debidamente tratada. Las bebidas calientes y refrescos embotellados son más seguros.
3. No tome hielo que no haya sido preparado con agua segura.
4. Consumir sólo leche envasada y derivados lácteos debidamente higienizados.
5. Prestar atención a la repostería y a los helados, ya que pueden ser origen de enfermedades.
6. Evite consumir pescado y marisco crudo, existen países en los que algunas especies pueden ser peligrosas incluso aunque estén cocinadas.
7. Las comidas deben estar suficientemente cocinadas y servirse calientes.
8. Debe tener cuidado con las salsas y preparados que contengan huevos crudos.
9. La fruta debe ser pelada personalmente y las verduras no deben comerse crudas. Las ensaladas pueden ser peligrosas.
10. Debe evitar la comida de los vendedores callejeros.

Tratamiento del agua potencialmente peligrosa

Ebullición: Durante 1 minuto. Airear para mejorar el sabor.



Cloración: 2 gotas de lejía (apta para consumo humano) por litro. Esperar 30 minutos antes de consumirla



Agua de bebida
Tabletas purificadoras

Agregar 1 tableta
en 1 litro de agua

Esperar 30 minutos
antes de usar

El agua está
lista para beber


El yodo y el uso de pastillas potabilizadoras pueden ser también un sistema eficaz para tratar el agua.



Los alimentos: **COCINADOS,**



PELADOS, o...



**NO
TOMADOS**



ALIMENTOS Y BEBIDAS




1.- LAVADO DE MANOS



2.- BEBA AGUA EMBOTELLADA O HERVIDA DURANTE 1 MINUTO



Grifo o pozo:



3.- EVITAR HIELO





4.- ALIMENTOS, COCINADOS; PELAR FRUTA:





Enfermedades transmitidas por vectores



asanec
Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA



Enfermedades inmunoprevenibles: Fiebre Amarilla




Fiebre amarilla. Stamaril®.

Virus vivos cepa 17D embrión de pollo.

Pauta: 1 dosis im. o sc. Se debe administrar 10 días antes del viaje.

Vacuna obligatoria en algunos países de África subsahariana y América. Suministrada por CVI.

Contraindicaciones: < 9 meses de edad, embarazo / lactancia, Inmunodeprimidos graves, Enf del timo, alergia a la proteína de huevo. Una dosis válida de por vida (desde julio 2016).





INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH – 18 NOVEMBER 2022 (REVISED ON 3 JANUARY 2023)



Country List¹

Country vaccination requirements² and WHO recommendations for vaccination against yellow fever, poliomyelitis, and malaria prophylaxis in international travellers

ANGOLA

Yellow fever (2015)

Country requirement at entry: proof of vaccination against yellow fever is required for all travellers aged 9 months or over.

WHO vaccination recommendation: yes

Malaria (2018)

Malaria risk due predominantly to *P. falciparum* exists throughout the year in the entire country.

WHO recommended prevention: C

THAILAND

Yellow fever (2022)

Country requirement at entry: proof of vaccination against yellow fever is required for travellers aged 9 months or over arriving from countries with risk of yellow fever transmission, and for travellers having transited for more than 12 hours through an airport of a country with risk of yellow fever transmission.

WHO vaccination recommendation: no

Malaria (2022)

Malaria risk exists throughout the year in rural (especially forested and hilly) areas of the country, mainly toward the international borders, including the southernmost provinces. There is no risk in cities (e.g. Bangkok, Chiang Mai and Pattaya), urban areas, Samui Island, and the main tourist resorts of Phuket Island. However, there is a risk in some other areas and islands. *P. falciparum* resistance to mefloquine and to quinine has been reported from areas near the borders with Cambodia and Myanmar. Artemisinin resistance has been reported near the border with Cambodia. *P. vivax* resistance to chloroquine has been reported. Human *P. knowlesi* infection has been reported.

WHO recommended prevention in risk areas: A; in areas near Cambodia and Myanmar borders: C

SENEGAL

Yellow fever (2021)

Country requirement at entry: proof of vaccination against yellow fever is required for travellers aged 9 months or over arriving from countries with risk of yellow fever transmission, and for travellers having transited through an airport of a country with risk of yellow fever transmission.

WHO vaccination recommendation: yes

Malaria (2018)

Malaria risk due predominantly to *P. falciparum* exists throughout the year in the entire country. There is less risk from January through June in the central western regions.

WHO recommended prevention: C



Recomendaciones. Otras vacunas.




Figura 1: Países/territorios/áreas que reportan casos autóctonos de dengue (noviembre 2022 – noviembre 2023) * Basado en los datos más recientes disponibles (los datos deben interpretarse considerando las diferencias en las tasas de notificación y las definiciones de casos entre las regiones).



Recomendaciones. Profilaxis contra la malaria

Fármaco	Edad		Duración			Contraindicaciones	A tener en cuenta
ATOVACUONA-PROGUANIL <i>Malarone, Malaway</i>	>40Kg ADULTO	≥11-40kg PEDIÁTRICO	 / día			Insuficiencia renal grave. Toma de metoclopramida o tetraciclinas. Embarazo y LM 	Coste elevado sin receta
			+ 1 día	viaje	+ 7 días		
MEFLOQUINA <i>Lariam</i>	>3 meses, >5Kg		 / semana			Epilepsia, depresión, enfermedades psiquiátricas, arritmias, betabloqueantes, antagonistas del calcio, antihistamínicos. A partir del 2º T Embarazo y LM. 	Duración del viaje
			+ 1 sem	viaje	+ 4 sem		
DOXICICLINA 100mg	≥ 8 años		 / día			Fotosensibilidad, insuficiencia hepática grave, tratamientos hormonales y ACHOs Embarazo y LM. 	Coste bajo sin receta, viajes de última hora. TTO otras infecciones bacterias.
			+ 1 día	viaje	+ 4 sem		
CLOROQUINA <i>Resochín</i>	-		 / semana				Resistencias. Poca utilidad clínica.
			+ 1 sem	viaje	+ 4 sem		



MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS PREVENCIÓN PICADURA DE MOSQUITOS

¿¿¿Cómo protegerse de la picadura del mosquito???

- **Repelentes en piel expuesta.**
- **Uso de mosquiteras (MTI) en ventanas, camas, cunas y carritos de bebé / Aire acondicionado.**
- **Insecticida/Repelentes en ropa exterior.**
- Ventiladores, espirales antimosquitos, sprays.





Prevención picaduras mosquitos: medidas no farmacológicas

REPELENTES: Sustancias que se aplican sobre la piel para ahuyentar a los insectos y así evitar las picaduras . No matan al insecto pero lo alejan.

DEET

ICARIDINA/PICARIDIN

IR3535

PMD/CITRIODIOL

ACEITES NATURALES

Table 13.1 Characteristics of the Ideal Mosquito Repellent

Characteristic	Comment
Efficacy	In even the highest mosquito densities, it will have a longevity of 6 hours before first bite Efficacy not affected by environmental condition, heat, humidity, sunlight, and so forth
Cost	Lowest cost and minimal amount of product required per application to achieve greatest affect
Acceptability	Good, cosmetically acceptable formulation; nongreasy, nonoily, and low odor
Safety	Highly favorable side-effect profile and minimal skin sensitization; hypoallergenic

CÓMO APLICAR LOS REPELENTES:

- Aplicar sólo en piel expuesta: mañana-tarde-noche
- No aplicar en cortes, heridas ni piel irritada.
- Repelente y protección solar: primero protector solar, a los 20/30 minutos, aplicar repelentes.



REPELENTES USO TÓPICO

DEET (Dietiltoluamida)

- Largo historial de seguridad y evaluación.
- Es el más efectivo.
- Se puede usar en adultos, niños y mujeres embarazadas.
- Se comercializa a concentraciones entre el 5-50%.
- No se recomiendan concentraciones superiores del 50%.



VENTAJAS:

- Protección de alto espectro (moscas, mosquitos, flebótomos, pulgas)

DESVENTAJAS:

- Aceitoso, olor distintivo, deteriora el plástico.
- No tan efectivo contra garrapatas y chinches.

Table 1: Examples of protection times of insect repellents containing various concentrations of DEET³


Concentration of DEET, %	Approximate protection time, h
30	6
15	5
10	3
5	2

Note: DEET = N,N-diethyl-m-toluamide, also known as N,N-diethyl-3-methylbenzamide.





Repelentes: uso tópico en niños/as



asanec
Asociación Andaluza de Enfermeras Comunitarias

Se comercializan diferentes marcas con DEET a concentraciones similares. Se observará que en las instrucciones del fabricante hay diferencias en la edad de aplicación. Esto se debe a los otros excipientes que hay en la formulación.

- ¿Qué repelente uso?
- ¿A qué concentración?
- ¿Puedo usar el mismo que los padres?
- ¿Cuántas aplicaciones al día?

Valorar:

.- Edad:

.- Riesgo del viaje: País, duración, VFRs o viaje de turismo, viaje organizado/no

DEET: a partir de los 2 meses



A partir de los 2 años



NIÑOS

- No dejar que los niños se lo apliquen, debe **hacerlo un adulto**.
- El adulto se lo echa en las manos y luego se lo aplica al niño.
- **No ponerlo alrededor de la boca ni en las manos** de los niños para evitar su ingestión y utilizarlo con moderación alrededor de los oídos..
- Valorar número de aplicaciones (especialmente cuando estén en el exterior)

En lactantes, priorizar uso de mosquiteras



MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS PREVENCIÓN PICADURA DE MOSQUITOS

- Uso de **mosquiteras** (mejor las tratadas con insecticida) en ventanas, camas, coches de bebés/ **Aire acondicionado**.
- Usar **camisas de manga larga y pantalón largo**.
- Evitar colores oscuros, llamativos y estampados florales. Se recomiendan **colores claros, neutros**.
- Evitar uso de perfume y cremas perfumadas.
- **Tratar la ropa exterior con repelente textil (IR3535 TEXTIL)**



Estas medidas son especialmente importantes en niños y mujeres embarazadas






Recomendaciones. Enfermedades inmunoprevenibles



Vacuna obligatoria para viajeros en peregrinación / trabajadores a la Meca, se debe administrar 10 días antes del viaje.

>2 a



>12 m



RABIA



- Valorar prep según riesgos asociados al viaje.
- Evitar interacción intencional (dar de comer, acariciar) animales salvajes/domésticos
- En caso de mordedura, arañazo → lavado 15', antiséptico y buscar atención urgente
(útil pequeño botiquín curas)



ESQUISTOSOMIASIS



- **Evitar los baños en aguas dulces.**
- Si se atraviesan cauces de ríos debe usarse botas impermeables.
- El uso tópico de DEET en la piel antes del baño podría disminuir el riesgo, pero sería de corta duración y la eficacia de esta medida no es alta.





Recomendaciones. Enfermedades inmunoprevenibles



Vacunas OBLIGATORIAS	Fiebre Amarilla (Stamaril®) Meningitis tetravalente (Nimenrix®, Menveo®, Medquafi®) Poliomielitis (Imovax®)
Vacunas SISTEMÁTICAS	Hepatitis B Tétanos Triple Vírica Gripe
Vacunas RECOMENDADAS	Cólera (Vaxchora®) Fiebre tifoidea (Vivotif®, Typhim Vi®) Hepatitis A (Avaxim®, Havrix®, Vaqta®) Poliomielitis (Imovax®) Rabia (Rabipur®) Encefalitis Centroeuropea (Ticovac, FSE-INMUN®) Encefalitis Japonesa (Ixiaro®)



CONSULTA ENFERMERÍA

TASA

Fiebre Amarilla
Meningitis ACWY
Polio
ECE
Rabia (pre-exposición)

ESPAÑA
SPAIN
ESPAGNE

REGlamento Sanitario Internacional
INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS
Règlement Sanitaire International

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACIÓN O PROFILAXIS
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE PROPHYLAXIE

Expedido a / Issued to / Délivré à } D.

N.º del pasaporte o del documento justificativo
Passport No. or Travel Document No.
Numéro du passeport ou de la pièce justificative } G 086036

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACIÓN O PROFILAXIS
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE PROPHYLAXIE

Certifíquese que:
This is to certify that. / Nous certifions que:

nacido(a): / date of birth: / né(e):
sexo: / sex: / de sexe:
nacionalidad: / nationality: / et de nationalité:

documento nacional de identidad: / national identification document, if applicable: / document d'identification national, le cas échéant:
cuya firma aparece a continuación: / whose signature follows: / dont la signature suit:

ha sido vacunado(a) en la fecha indicada frente a (nombre de la enfermedad):
has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against: (name of disease or condition):
a été vacciné(e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date indiquée contre: (nom de la maladie ou de l'affection):

de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional.
in accordance with the International Health Regulations / conformément au Règlement sanitaire international.

Vacuna o Profilaxis	Fecha	Firma y título profesional del clínico supervisor	Fabricante y n.º de lote de la vacuna o producto preventivo	Validez del certificado desde: hasta:	Sello oficial del Centro de Vacunación
Vaccine or prophylaxis	Date	Signature and professional status of supervising clinician	Manufacturer and batch no. of vaccine or preventive	Certificate valid from: until:	Official stamp of the administering centre
Vaccin ou agent prophylactique	Date	Signature et titre du clinicien responsable	Fabricant du vaccin ou de l'agent préventif et numéro du lot	Certificat valable à partir de: jusqu'à:	Cachet officiel du centre habilité
YELLOW FEVER				Desde / From: Hasta / Until TODA LA VIDA FOR THE WHOLE LIFE	REINO DE ESPAÑA AL-04 SANIDAD EXTERIOR

Fiebre tifoidea inyectable
Hepatitis A



GOBIERNO DE ESPAÑA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA
DEPENDENCIA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
CENTRO DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL ALMERÍA

Ha sido atendido en nuestro Servicio de Sanidad Exterior el viajero

D/Dª con

D.N.I. nº: el cual, según nos manifiesta, va a realizar un viaje al extranjero

La citada visita hace recomendable, siguiendo las indicaciones de la O.M.S. y/o del Ministerio de Sanidad al respecto y salvo mejor criterio de su médico, la/s vacunación/es o quimioprofilaxis siguientes:

- Vacuna contra *F. Amarilla* STAMARIL® (Pagar Tasa en banco). Administrada CVI 10 sept 2024
- Vacuna contra *M. Meningocócica Tetravalente*. Administrada ~~CVI~~ CVI 10 sept 2024
- Vacuna contra *Cólera*. VAXCHORA® (Con receta médica).
- Vacuna contra *F. Tifóidea Oral*. VIVOTIF® (Con receta médica).
- Vacuna contra *F. Tifóidea Inyectable*, 1 dosis. (Sin receta médica).
 - TYPHIM VI®
- Vacuna contra *Hepatitis A* 2 dosis ⇒ 0mes 6/12 meses
 - HAVRIX 1440® (ADULTO) HAVRIX 720® (NIÑO)
 - VAQTA 50 U® (ADULTO) VAQTA 25 U® (NIÑO)
 - AVAXIM 160 U® (ADULTO)

(Las recetas de Hepatitis A (HAVRIX y AVAXIM) necesitan VISADO que será realizado por su médico y posteriormente éstas serán selladas en su Centro de Salud o en Inspección de Farmacia de su Distrito Sanitario. Sin la receta sellada no le harán el descuento en la farmacia).

Vacuna contra *Hepatitis B*, 3 dosis ⇒ 0mes 1mes 6 meses.

Vacuna contra el *Tétanos-Difteria*:

- Primovacunación ⇒ 0mes 1mes 1año.
- 1 dosis de recuerdo (Gratuita).

Vacuna contra la *Gripe*.

Otras vacunas: TV, Poliomielitis... Administrada ~~CVI~~ CVI 10 sept 2024

Administrar hoy, 10 de septiembre 2024/
Administrar ≥ 28 septiembre 2024

Centro de Vacunación Internacional
C/ Hermanos Machado, 23 - 04004 ALMERÍA
Telf. 950 75 94 18



GOBIERNO DE ESPAÑA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA
DEPENDENCIA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
CENTRO DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL ALMERÍA

QUIMIOPROFILAXIS ANTIPALÚDICA/ANTIMALÁRICA:

Mefloquina. (8 comp.), facilitado por el mismo centro de vacunaciones o en Farmacia de su Distrito Sanitario correspondiente. ~~!!! NO EN FARMACIAS!!!!~~

Nº envases:

Atovaquona 250 mg + Proguanil 100mg (ADULTOS) (12 ~~comp.~~, 24 ~~comp.~~)
(Con receta médica se adquiere en farmacias).

Nº envases:

Atovaquona 62,5 mg + Proguanil 25 mg (PEDIÁTRICO) (12 ~~comp.~~)
(Con receta médica se adquiere en farmacias).

Nº envases:

Cloroquina. (50 ~~comp.~~) (Con receta médica se adquiere en farmacias).

Nº envases:

Doxiciclina 100 mg (42 ~~cáps.~~) (Con receta médica se adquiere en farmacias).

Nº envases:

Otros Antipalúdicos:

En Almería, a 10 de septiembre de 2024

Centro de Vacunación Internacional
C/ Hermanos Machado, 23 - 04004 ALMERÍA
Telf. 950 75 94 18



Intervalo mínimo entre la administración no simultánea de vacunas distintas

TIPO DE VACUNA	INTERVALO MÍNIMO
Entre 2 vacunas inactivadas	Ninguno
Entre inactivadas y atenuadas	Ninguno
Entre 2 atenuadas no simultáneas	4 semanas*

* Aplicable solo en el caso de que ambas vacunas se administren por vía parenteral (no si una es oral o intranasal).



GOBIERNO
DE ESPAÑA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN
ALMERÍA

DEPENDENCIA DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

CENTRO DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL
ALMERÍA



BOTIQUÍN DE VIAJE

1.- **ANALGÉSICOS/ANTITÉRMICOS** (dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares)

- Paracetamol

2.- **ANTIÁCIDOS/PROTECTOR DE ESTÓMAGO:**

- Almagato (Almax)

- Omeprazol

3.- **ANTIALERGICOS/ANTIISTAMÍNICO:** antihistamínicos orales o un corticoide oral.

4.- **ANTIDIARRÉICOS:**

a) En caso de diarrea leve o moderada se realizará dieta tomando abundante agua con sales de rehidratación oral.

b) Los adultos pueden utilizar antidiarreicos como la loperamida (Fortasec) o el racecadotril siempre que no haya signos de alarma (fiebre, sangre, pus o moco en heces, diarrea prolongada).

c) CONSULTAR A UN MÉDICO si la diarrea persiste, se agrava o existen signos de alarma.

5.- **PROTECTOR SOLAR:** cremas o lociones con filtro solar alto o pantalla total.

6.- **REPELENTE DE MOSQUITOS:**

a) **PIEL EXPUESTA:** - 3 veces al día (mañana-tarde-noche).

1.- DEET al 40% -50%

2.- Icaridina 20% (KBR3023).

3.- IR3535 30%

Entre la aplicación del protector solar y el repelente deben transcurrir al menos 20-30 minutos. Se aplicará primero el protector solar y posteriormente el repelente de mosquitos.

b) **ROPA Y MOSQUITERAS:**

- IR3535 textil (Diptron Textil Repellent®, Biteprevent® Anti-Insect Spray, Wild at Ease®

Repelente de Insectos aplicación textil)

7.- **USO DE MOSQUITERAS**

8.- **VESTIR ROPA DE MANGA LARGA, PANTALÓN LARGO Y COLORES CLAROS. EVITAR PERFUME Y CREMAS PERFUMADAS.**

Si al regreso de su viaje a una zona tropical presenta alguno de los siguientes síntomas: Fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor abdominal, diarrea, lesiones en la piel, sangre en la orina, acuda a su médico de familia. Si su médico considera que debe recibir atención especializada puede derivarle a la **Unidad de Medicina Tropical del Hospital de Poniente, El Ejido (Teléfono: 950-022685, Fax: 950-022904).**

Las personas con **enfermedades crónicas** deberán llevar la medicación habitual en cantidad suficiente para todo el viaje y, si es posible, acompañada de un informe médico.

Descargar aplicación MAUC (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación). Esta app le proporcionará información general sobre otros países, sus condiciones socio-políticas, riesgos de seguridad y condiciones acerca de su viaje.

Centro de Vacunación Internacional
C/ Hermanos Machado, 23 - 04004ALMERÍA
Telf. 950 75 94 18
citaviajero.almeria@correo.gob.es



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

SUBDELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN ALMERÍA



Registro en Diraya de las vacunas del viajero

- Farmacia (AN1617527550).
- NH: 300000009069720,Mujer,6 años
(NHF: 300000009069720,)
- Sin antecedentes conocidos
- Sin antecedentes familiares co
- Se desconoce si tiene alergia
- Hábitos de vida
- Sin problemas clinicos conocid
- Sin medicacion conocida
- Cuestionarios y escalas
- Sin constantes recogidas
- Pruebas (análisis, por imagen y funcio
- Derivaciones
- Procesos asistenciales
- Cuidados de enfermería
- Pruebas Diagnósticas por Imagen

Salir



Fecha de consolidacion en servicios centrales: 29/08/2024 19:19:30

   Consulta de Archivo

 Usuario de alta.

Ficha vacunación



No tiene ninguna vacuna asociada

Nueva vacuna aislada

Nueva Vacuna Aislada

Fecha de vacunación
28/08/2024 

Vacuna

Vacuna

Seleccione una vacuna...

- Difteria/tetanos/pertussis/HB (DTPa/HB)
- Difteria/tetanos/pertussis/HB (dTpa/HB)
- Difteria/Tétanos/Pertussis/Hepatitis B/Haemophilus-influenzae b (DTP/HB/Hib)
- Encefalitis Japonesa (Encef. Jap.)
- Encefalitis Virica CentroEuropea (Encef. CE.)
- Fiebre Amarilla (Fieb. Amarilla)
- Fiebre Tifoidea (Fieb. Tifoidea)**
- Gripe (Gripe)
- Haemophilus-influenzae b (Hib)
- Hepatitis A (HA)

Search bar with question mark icon

Empty text input field

Aceptar Cancelar



Nueva Vacuna Aislada

Fecha de vacunación

28/08/2024



Vacuna

Fiebre Amarilla (Fieb. Amarilla)

Acción

 Vacunar Vacunación externa

Lote

Lugar donde se realizó la vacunación:

 Andalucía Otra Comunidad Autónoma Fuera de España

Lote conocido:

 Sí NoRegistre la máxima información posible del lote. Si lo desea, puede volver a la [lista de lote registrados](#)

Código Nacional / Internacional

Laboratorio Nombre comercial

Nombre del formato

Lote

Caducidad



Descripción vacuna externa

0/500 caracteres

Comentarios (opcional)

Lot. V2M000V Cad. 30/09/2026

Comentarios (opcional)

Ficha vacunación



14 Lot. V2M000V Cad. 30/09/2026 rilla

Windows taskbar: BECERRA FERNANDEZ, ANTONIA Sanitario / Lucano (Córdoba)

Nueva Vacuna Aislada

Fecha de vacunación: 17/09/2024

Vacuna: Fiebre Tifoidea (Fieb. Tifoidea)

Acción: Vacunar Vacunación externa

Lote: Adquirido por el SSPA Adquirido por el usuario

Verifique primero si el lote ya está registrado. Si no lo encuentra, debe [registrarlo](#)

W2A3D4V 652468 SANOFI AVENTIS S.A. TYPHIM VI TYPHIM VI SOLUCION INYECTABLE , 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,5 ML + 2 AGUJAS (31/03/2025)
3004008 724008 JANSSEN-CILAG, S.A. VIVOTIF VIVOTIF CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES 3 cápsulas (31/12/2024)
3004006 724008 JANSSEN-CILAG, S.A. VIVOTIF VIVOTIF CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES 3 cápsulas (31/12/2024)
w2a304v 652468 SANOFI AVENTIS S.A. TYPHIM VI TYPHIM VI SOLUCION INYECTABLE , 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,5 ML + 2 AGUJAS (30/11/2025)
W2B192V 652468 SANOFI AVENTIS S.A. TYPHIM VI TYPHIM VI SOLUCION INYECTABLE , 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,5 ML + 2 AGUJAS (31/07/2025)
HD6124 690375 PFIZER, S.L NIMENRIX NIMENRIX POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA (1 DOSIS) 1 DOSIS (0,5 ML) (31/01/2026)
3004042 724008 JANSSEN-CILAG, S.A. VIVOTIF VIVOTIF CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES 3 cápsulas (28/02/2025)
V2B192V 652468 SANOFI AVENTIS S.A. TYPHIM VI TYPHIM VI SOLUCION INYECTABLE , 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,5 ML + 2 AGUJAS (31/07/2025)

Motivo de vacunación: Vacunación indicada antes de viaje

Comentarios (opcional)

Ficha vacunación

14 años

Fieb. Amarilla  

Fieb. Tifoidea



CONCLUSIONES:



- **USO DE REPELENTES EN PIEL EXPUESTA M-T-N**
- **PRIMERO PROTECTOR SOLAR.....20/30 MINUTOS.....REPELENTE EN PIEL**
- **NIÑOS: VALORAR EDAD Y TIPO DE VIAJE**
- **TRATAR ROPA EXTERIOR CON INSECTICIDA/REPELENTE TEXTIL**
- **ROPA COLORES CLAROS/ MANGA LARGA-PANTALÓN LARGO**
- **MOSQUITERA/ AIRE ACONDICIONADO**
- **EVITAR PERFUME Y CREMAS PERFUMADAS**

**AGUA MINERAL / NO HIELO
COCINADO-PELADO O NO TOMADO**

**CONOCER INTERVALOS ENTRE VACUNAS
ANTE CUALQUIER DUDA: LEER FICHA TÉCNICA
REGISTRO INFORMÁTICO**



Caso

Mariama, 2 años, nacida en España, de padres malienses, va 3 meses en verano de vacaciones al pueblo, a visitar a su familia. ¿Qué vacunas y recomendaciones precisa?

MALI

Yellow fever (2020)

Country requirement at entry: proof of vaccination against yellow fever is required for all travellers aged 9 months or over.

WHO vaccination recommendation: yes

Recommended for all travellers aged 9 months or over going to areas south of the Sahara Desert.

Not recommended for travellers whose itineraries are limited to areas within the Sahara Desert.

Malaria (2020)

Malaria risk due predominantly to *P. falciparum* exists throughout the year in the entire country.

WHO recommended prevention: C



- Revisión AP y calendario vacunal niña sana:
 - Hexavalente, 3dosis,
 - Neumococo, 3 dosis,
 - Meningococo B, 3dosis,
 - Men ACWY, 1/2 dosis,
 - TV, 1 dosis,
 - Varicela, 1 dosis,
 - Gripe, 1 dosis.

- Fiebre amarilla
- Fiebre tifoidea
- VHA
- VPI, valorar refuerzo
- Profilaxis malaria, ajustar s/peso; ideal: misma que resto de familia
- Repelente mosquitos
- Consejos agua y alimentos



Caso

Familia de 2 adultos (35 y 32 años) que viajan con sus 2 hijos (3 años y 8 meses) a Riviera Maya durante 1 semana. Viaje organizado en hotel de lujo. El niño de 8 meses está con lactancia materna. ¿Qué vacunas y recomendaciones precisa?



MEXICO

Yellow fever (2022)

Country requirement at entry: no

WHO vaccination recommendation: no

Malaria (2022)

Malaria risk due almost exclusively to *P. vivax* exists intermittently throughout the year in some rural areas that are not often visited by tourists. These areas are located in the states of Campeche, Chiapas, Chihuahua and Sinaloa.

WHO recommended prevention in risk areas: A

- Revisión calendario vacunal de toda la familia:

.- Re
año

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia

AVAXIN 160

Embarazo

No existen datos suficientes sobre la utilización de la vacuna frente a la hepatitis A (inactivada, adsorbida) en mujeres embarazadas. Los estudios en animales son insuficientes para determinar las reacciones en el embarazo, desarrollo embrional/fetal, parto o desarrollo postnatal. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Avaxim no se debería utilizar durante el embarazo excepto si fuese claramente necesario y después de una evaluación de los riesgos y beneficios.

Lactancia

Es posible la utilización de la vacuna durante el periodo de lactancia.

- VHA para el padre y el niño de 3 años.
- ¿Hepatitis A para la madre y lactante?



¿Dudas, preguntas?



ENLACES DE INTERÉS

- OMS: World Health Organization (WHO)
- ECDC : Homepage | European Centre for Disease Prevention and Control (europa.eu)
- CDC YELLOW BOOK : <https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2024/>
- GREEN BOOK UK : <https://www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-infectious-disease-the-green-book#the-green-book>
- Public Health Scotland: Home - Fit for Travel: <https://www.fitfortravel.nhs.uk/home>
- Instituto de Medicina Tropical Amberes, Bélgica: Home | Wanda
- Andavac: <https://www.andavac.es/>
- Fundación IO: <https://fundacionio.com/>
- Asociación Española de Pediatría. <https://vacunasaep.org/>
- International Society of Travel Medicine: <https://www.istm.org/>



GOBIERNO
DE ESPAÑA

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ALMERÍA

DEPENDENCIA DE
AGRICULTURA Y PESCA
DEPENDENCIA DE
INDUSTRIA Y ENERGÍA
DEPENDENCIA DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Subdelegación del Gobierno en Almería Dependencia de Sanidad y Política Social Centro de Vacunación Internacional

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

**Dependencia de Sanidad
Centro de Vacunación Internacional. Almería
C/ Hermanos Machado 23
950 75 94 18
citaviajero.almeria@correo.gob.es**



Caso

Idrissa, 28 años, nacido en Senegal, viaja en 24 horas a su país de origen para visitar a su familia durante 4 meses. Llegó a España hace 4 años y éste es su primer viaje ¿Qué vacunas y recomendaciones precisa?



- Revisión AP y calendario vacunal:

- Hepatitis B 3 dosis
- TV 2 dosis
- Td 5 dosis

- Fiebre amarilla (CVI)
- Fiebre tifoidea (TYPHIM Vi®-NO FINANCIADA-PRESCRIPCIÓN)
- VHA???
- VPI (CVI-CS)
- Meningitis tetravalente (CVI-CS)
- Profilaxis malaria (DOXI-ATOV-PG-FINANCIADA)
- Repelente mosquitos
- Prevención rabia
- Consejos agua y alimentos




Caso

Pareja (34 y 31 años) va de viaje de luna de miel a Bali 2 semanas. Inician el viaje en 5 días. Duermen en hoteles y comen en restaurantes y mercados locales. Se dirigen a su MAP para que le recete medicación para hacer un botiquín. ¿Qué vacunas y recomendaciones precisa?



- Revisión AP y calendario vacunal:
 - Td 5 dosis

- VHA
- Fiebre tifoidea (TYPHIM Vi®-NO FINANCIADA-PRESCRIPCIÓN)
- ¿Profilaxis malaria?
- Repelente mosquitos
- Consejos agua y alimentos
- Consejos sobre ZIKA y concepción
- Prevención de rabia



asanec

Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria